

请注意预防麻疹！

疾病介绍


- 麻疹是由麻疹病毒引起的传染病。
- 麻疹的传染性极强，对麻疹病毒没有免疫力的人一旦感染，发病率几乎为百分之百，因此需在幼年时期接种2剂疫苗。
- 发病初期会出现咳嗽、流鼻涕等感冒样症状。之后开始高烧和起皮疹，还可能出现肺炎、脑炎等严重并发症。
- 潜伏期（从感染到发病的期间）约为10天，传染期（可能传染给他人的期间）为发病前1天至退烧后3天。
- 东京都提醒广大都民，若未接种2剂疫苗且未感染过麻疹，请及时前往医疗机构咨询（抗体检查或疫苗事宜）。



※示意图由生成式AI制作

发生频率

- 近年来，东京都曾在2019年发生大规模麻疹疫情，去年则仅次于该年，报告了34例病例（其中集体感染3例）。而今年到目前为止，病例数已超过去年总数，需要大家多加留意疫情动态。



如果怀疑感染了麻疹

- 请致电医疗机构进行咨询后就医。
- 请尽量减少外出。同时请减少乘坐公共交通工具。
- 请佩戴口罩。

请配合保健所的调查和检查

- 根据厚生劳动省的通知，出现疑似麻疹病例时，保健所将进行调查和检查。
- 如果收到保健所的联络，敬请配合相关调查、检查及健康观察。
- 调查时将询问疫苗接种记录和是否感染过麻疹，因此请提前准备好母子健康手册等相关材料，以便工作人员查阅。
- 如果有何疑虑，欢迎前往附近的保健所进行咨询。

咨询附近保健所

