

梅毒，正在不断增加

这是什么病？


这是一种由梅毒螺旋体病原体引起的传染病，会通过性行为，从粘膜及皮肤的微小损伤处感染。感染初期几乎没有症状，在自己也没注意到的情况下，病情会继续发展，并在无意中传染给其他人。

感染后大约1个月，感染的部位（性器官、肛门、口腔等）会出现疱疹、硬结等，即使不治疗，症状也会在几周后消失，自然好转。但病情仍会在本人察觉不到的情况下静静发展，在几年~几十年后，导致心脏、血管、神经出现异常，也有可能出现失明及痴呆等症状。

此外，母亲怀孕时如感染了梅毒，会通过胎盘传染给胎儿，进而有可能会引起死产、早产、新生儿死亡、以及先天性障碍（先天梅毒）。

发生病例有多少？

2016~2020年每年大约有1,700个病例，而2022年截止到第48周，已经报告了大约3,400例，为之前的2倍，刷新了迄今为止的最高记录。



2022年1~48周

是怎样感染的？

通过性行为，直接接触含有病原体的分泌液（精液、腔分泌液等）、血液等，从粘膜及损伤处感染。梅毒会多次感染，并在自己也察觉不到的情况下传染给其他人。

怎样预防？

正确使用避孕套可以有效预防。口交（Oral sex）、肛交（Anal sex）也会感染。为了预防感染，正确使用避孕套很重要。如果有所怀疑，请接受检查。

梅毒问与答

问：可以自然治愈吗？

答：即使感染了梅毒，有时也会没有症状，或皮肤出现症状也不疼痛。有时不治疗，症状也会消失，但不会自然治愈，需要用抗生素治疗。如果口服，则每次的服药数量会较多，服药期间会较长。

现在，用于肌肉注射的青霉素制剂已获批准，增加了口服以外的治疗选项。确定感染后，如果是早期阶段，注射一次即可治愈，有比口服方便的优点。

如果不治疗，可能会引起对于神经及心脏的重大损害，因此尽早检查和治疗十分重要。

问：感染一次以后会再次感染吗？

答：医生是通过检查血液中的抗体等来判断是否感染了梅毒。虽然感染者的血液中会有一些的抗体，但不等于能够防止再次感染。因此，如果不采取妥善的预防措施（使用避孕套、让性伙伴接受治疗等），是有可能再次感染梅毒的。

问：使用避孕套就不会感染吗？

答：使用避孕套，可使粘膜和皮肤不会直接接触感染的部分，这样可以有效预防感染。但避孕套覆盖不到的部位的皮肤等也可能被感染，因此不能说使用避孕套就可以100%预防。即使没有症状也可能被感染，建议接受检查。

问：可以接受检查吗？

答：如有症状，请前往医疗机构检查。

在东京都内的保健所及东京都的检查室，都可以匿名、免费接受艾滋病及梅毒检查。

此外，也有进行其他性传染病（淋菌、衣原体传染病）检查的保健所。

梅毒检查通过采血进行。

问：担心感染了梅毒。在哪里可以咨询？

答：在居住地的当地保健所可以咨询。此外，如果出现了症状，建议前往医疗机构检查。