

Continúan aumentando los casos de sífilis

¿Qué tipo de enfermedad es?


Es una infección causada por la bacteria *Treponema pallidum*. Se contagia principalmente por contacto sexual a través de las mucosas o pequeñas lesiones de la piel. Casi no se presentan síntomas, por lo que la enfermedad avanza sin darse cuenta, pudiendo contagiar a otros sin saber.

Luego de aproximadamente un mes de haberse contagiado, aparecerán sarpullidos y protuberancias en las partes infectadas (genitales, ano, boca, etc.), pero desaparecerán naturalmente en unas semanas aunque no reciba tratamiento. De esta forma, la enfermedad avanzará silenciosamente sin que se dé cuenta, y luego de varios años, incluso décadas, atacará el corazón, el sistema sanguíneo y el sistema nervioso. También hay riesgo de ceguera y demencia.

Además, en caso de que una mujer embarazada contraiga sífilis, puede contagiar al feto a través de la placenta provocando su muerte, el parto prematuro, la muerte del recién nacido o discapacidades congénitas (sífilis congénita).

¿Cuánto ha aumentado?

Entre los años 2016 a 2020, había alrededor de 1.700 casos anuales, pero en el período de 48 semanas del año 2022, los casos informados alcanzaron aproximadamente 3.400, siendo del doble de lo normal y el máximo registrado hasta ahora.



Desde la semana 1 a 48 del año 2022.

¿Cómo se contagia?

La sífilis se contagia por contacto sexual, cuando las mucosas o la piel con lesiones entra en contacto directo con las secreciones (semen, secreciones vaginales, etc.), sangre, etc., infectadas. La sífilis puede contraerse varias veces, y puede contagiar a otros sin darse cuenta.

¿Cómo se previene?

El uso correcto del preservativo es efectivo para prevenir el contagio. Sin embargo, también puede contraer la infección mediante sexo oral y sexo anal, por lo que aquí también es importante usar correctamente los preservativos para evitar la infección. En caso de tener alguna preocupación, no dude en recibir el examen epidemiológico.

Preguntas y respuestas sobre la sífilis

P: ¿Puede curarse naturalmente?

R: Puede ser que no presente síntomas aunque se contagie de sífilis o no sienta dolor aunque presente síntomas en la piel. Los síntomas pueden desaparecer aunque no realice ningún tipo de tratamiento, pero no significa que se ha curado, por lo que es necesario un tratamiento con antibióticos. En caso de administración oral de medicamentos, la cantidad de comprimidos es mucha y el período se hace largo.

Actualmente, hay otras opciones como la administración de medicamentos a base de penicilina mediante inyección intramuscular. Tiene la ventaja de que es más conveniente que la administración oral, ya que si acude en una etapa temprana de la infección, una sola inyección puede llegar a ser suficiente.

Si no recibe tratamiento, puede provocar graves inconvenientes en el sistema nervioso o el corazón, por eso, es sumamente importante que reciba el examen y tratamiento sin demora.

P: ¿No volveré a contagiarme si ya he contraído la infección?

R: El médico diagnostica la infección de sífilis confirmando los anticuerpos en la sangre, etc., mediante el examen. Las personas que contrajeron la infección tienen una determinada cantidad de anticuerpos en la sangre, pero no significa que sean inmunes. Por este motivo, hay posibilidades de volver a contagiarse de sífilis si no toma las medidas de prevención apropiadas (uso de preservativos, tratamiento de la pareja, etc.)

P: ¿No me contagiaré si uso preservativos?

R: Usar preservativos para evitar el contacto directo entre la parte infectada y las membranas o piel es efectivo para prevenir el contagio. Pero también es posible contagiarse a través de partes no cubiertas por los preservativos, es decir que, el uso de preservativos no previene la infección con un 100 % de seguridad. Puede ser que haya contraído la infección aunque no presente síntomas, por lo que es importante que reciba el examen.

P: ¿Dónde puedo realizar el examen?

R: Realice una consulta en una institución médica en caso de presentar algún síntoma.

En los centros de sanidad (*hokenjo*) y laboratorios públicos de Tokio pueden realizarse exámenes de HIV y sífilis de forma anónima y gratuita.

Además, también hay centros de sanidad que realizan exámenes de otras enfermedades de transmisión sexual (gonorrea, clamidia).

El examen de sífilis se realiza mediante extracción de sangre.

P: Estoy preocupado porque puedo haber contraído sífilis. ¿Dónde puedo consultar?

R: Puede consultar en el centro de sanidad de la comunidad donde vive. En caso de presentar síntomas, vaya a una institución médica.