


โรคซิฟิลิส เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

เป็นโรคแบบไหน

เป็นโรคติดเชื้อที่เกิดจากแบคทีเรียทริโพเนมา แพลลิดีม โดยติดต่อผ่านทางบาดแผลขนาดเล็กบนผิวหนังและเยื่อเมือกต่างๆ จากการมีเพศสัมพันธ์ ซึ่งแทบจะไม่มีอาการปรากฏออกมาให้เห็นหลังจากได้รับเชื้อแล้ว โรคจึงดำเนินต่อไปโดยที่ผู้ที่ติดเชื้อเองก็ 모르ตัว และทำให้ผู้อื่นติดต่อไปด้วยโดยไม่รู้ตัวด้วยเช่นกัน หลังจากได้รับเชื้อแล้วประมาณ 1 เดือน จะเกิดผื่นหรือตุ่มนูนบริเวณที่ติดเชื้อ (อวัยวะเพศ ทวารหนัก ปาก เป็นต้น) แต่อาการนั้นจะหายเองภายในระยะเวลาไม่กี่สัปดาห์ แม้ไม่ได้รับการรักษาใดๆ ก็ตาม และโรคจะดำเนินไปอย่างเงียบๆ โดยที่ยังไม่รู้ตัว หลังจากนั้นผ่านไปหลายปีจนถึงหลายสิบปี จะเกิดความผิดปกติขึ้นที่หัวใจ เส้นเลือด ประสาท และอาจมีอาการอย่างเช่น ตาบอด หรือสมองเสื่อม นอกจากนี้ หากสตรีมีครรภ์ติดโรคซิฟิลิส ก็จะทำให้แพร่เชื้อไปสู่ทารกในครรภ์ได้ และมีผลทำให้ทารกเสียชีวิตในครรภ์คลอดก่อนกำหนด เสียชีวิตหลังคลอด หรือมีความบกพร่องแต่กำเนิด (โรคซิฟิลิสโดยกำเนิด)

มีผู้ติดเชื้อมากแค่ไหน

ในปีพ.ศ. 2559 ถึงปีพ.ศ. 2563 มีรายงานผู้ติดเชื้อประมาณ 1,700 รายต่อปี แต่ในปีพ.ศ. 2565 จำนวนผู้ติดเชื้อได้เพิ่มขึ้นเป็น 2 เท่าตัวภายในระยะเวลา 48 สัปดาห์ โดยมีรายงานจำนวนผู้ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ 3,400 ราย นับเป็นสถิติการติดเชื้อที่สูงที่สุดเท่าที่เคยมีมา



1 ถึง 48 สัปดาห์ในปีพ.ศ. 2565

ติดต่อได้อย่างไร

ติดต่อผ่านทางเยื่อเมือกและบาดแผลโดยการสัมผัสกับสารคัดหลั่งที่มีเชื้อโรคปนอยู่ (เช่น น้ำอสุจิ ตกขาว) เลือด ฯลฯ โดยตรงจากการมีเพศสัมพันธ์ ซิฟิลิสติดต่อได้หลายครั้งและทำให้ผู้อื่นติดต่อได้ด้วยโดยไม่รู้ตัว

ป้องกันได้อย่างไร

การสวมถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องเป็นการป้องกันที่มีประสิทธิภาพ เพศสัมพันธ์ทางปาก (Oral sex) และเพศสัมพันธ์ทางทวารหนัก (Anal sex) ก็สามารถติดต่อได้ การใช้ถุงยางอนามัยอย่างถูกต้องเป็นสิ่งสำคัญในการป้องกันการติดเชื้อ หากรู้สึกเป็นกังวล ขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อ

ถามตอบเกี่ยวกับโรคซิฟิลิส

Q มีโอกาสที่จะหายเองหรือไม่

A แม้จะติดโรคซิฟิลิสก็จะมีอาการปรากฏออกมาให้เห็น หรือแม้จะมีอาการที่ผิวหนังก็อาจไม่รู้สึเจ็บปวด ถึงจะไม่ทำการรักษาใด ๆ อาการก็จะหายไปเอง แต่โรคนี้จะไม่หายเองตามธรรมชาติ จำเป็นต้องรักษาโดยใช้ยาปฏิชีวนะ ในกรณีที่เข้ารับประทานจะต้องรับประทานครั้งละหลายเม็ดและรับประทานต่อกันเป็นเวลานาน ในปัจจุบัน ได้มีการอนุมัติให้ใช้ยาเพนนิซิลินชนิดฉีดเข้ากล้ามเนื้อ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกนอกจากการใช้ยารับประทาน หากได้รับการรักษาแต่เนิ่น ๆ หลังจากทราบว่าติดเชื้อ ก็จะรักษาได้โดยการฉีดยาเพียง 1 ครั้ง ซึ่งยาฉีดมีข้อดีตรงที่ใช้ง่ายกว่าการรับประทานยา หากไม่เข้ารับการรักษา อาจก่อให้เกิดความบกพร่องอย่างรุนแรงต่อประสาทและหัวใจ ดังนั้นก็ตรวจหาเชื้อและการเข้ารับการรักษาแต่เนิ่น ๆ เป็นเรื่องที่สำคัญมาก

Q หากเคยติดโรคไปแล้วครั้งหนึ่งจะไม่ติดอีกใช่ไหม

A แพทย์จะทำการวินิจฉัยว่าติดโรคซิฟิลิสได้จากการตรวจหาสารภูมิต้านทานในกระแสเลือด ซึ่งในกระแสเลือดของผู้ที่เคยติดโรคไปแล้วจะมีสารภูมิต้านทานอยู่ในระดับหนึ่ง แต่ไม่ได้หมายความว่าสามารถป้องกันไม่ให้ติดโรคอีกได้ ดังนั้นหากไม่หาวิธีการป้องกันที่เหมาะสม (เช่น ใช้ถุงยางอนามัย ให้คู่นอนเข้ารับการรักษา ฯลฯ) ก็อาจจะเป็นโรคซิฟิลิสได้อีก

Q ถ้าใช้ถุงยางอนามัยก็ไม่ติดโรคใช่ไหม

A การใช้ถุงยางอนามัยเพื่อไม่ให้เย็บและผิวหนัง ไปสัมผัสกับส่วนที่ติดเชื้อโดยตรงเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน แต่หากผิวหนังบริเวณที่ไม่ได้ครอบถุงยางอนามัยไปสัมผัสเข้าก็อาจจะติดเชื้อได้ ดังนั้น แม้จะใช้ถุงยางอนามัย ก็ไม่ได้หมายความว่าสามารถป้องกันได้ 100% แม้จะไม่มีอาการ ก็ติดต่อได้ เพราะฉะนั้นขอให้ไปตรวจหาเชื้อกันเถอะ

Q ตรวจหาเชื้อได้หรือไม่

A หากมีอาการ ขอให้เข้ารับการรักษาในสถานพยาบาล สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อ HIV และซิฟิลิสโดยไม่ต้องแจ้งชื่อจริงและไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขในกรุงเทพฯ และห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อของกรุงเทพฯ นอกจากนี้ ยังมีศูนย์บริการสาธารณสุขบางแห่งที่สามารถเข้ารับการตรวจหาเชื้อโรคทางเพศสัมพันธ์อื่น ๆ ได้ด้วย (โรคหนองในแท้ โรคหนองในเทียม) การตรวจหาเชื้อซิฟิลิสจะตรวจโดยการเจาะเลือด

Q เมื่อรู้สึกกังวลว่าตนติดโรคซิฟิลิสหรือไม่ จะสามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ไหน

A สามารถเข้ารับคำปรึกษาได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขในท้องถิ่นที่ตนพำนักอยู่ และหากมีอาการปรากฏออกมา ขอให้เข้ารับการรักษาที่สถานพยาบาล