

請注意預防麻疹！

☑疾病介紹


- 麻疹是由麻疹病毒引起的傳染病。
- 麻疹的傳染力非常強，沒有免疫力的人一旦感染，幾乎 100% 有可能會發病，因此孩童須接種 2 劑疫苗。
- 發病初期會出現咳嗽、流鼻水等類似感冒的症狀。接著出現高燒與皮疹，也可能引起肺炎、腦炎等嚴重併發症。
- 潛伏期（從感染到發病的期間）約為 10 天；傳染期（可能傳染給他人的期間）為發病前 1 天至退燒後 3 天。
- 東京都呼籲民眾，若疫苗接種未滿 2 劑且從未罹患麻疹，請諮詢醫療機構（進行抗體檢查或接種疫苗）。



※示意圖由生成式 AI 製成

☑發生頻率

- 近年來，東京都曾在 2019 年出現麻疹的大規模流行，並在去年發生了次高的 34 例病例（其中包含 3 例群聚感染）。今年截至目前為止病例數已超過去年，必須留意疫情發展狀況。



☑如果懷疑感染了麻疹

- 請透過電話向醫療機構諮詢後，再前往就診。
- 請盡量避免外出，並敬請配合避免搭乘大眾交通工具。
- 請佩戴口罩。

☑請配合保健所的調查與檢測

- 根據厚生労働省的通知，若發現任何疑似麻疹病例，保健所將進行調查與檢測。
- 當您接到保健所的聯絡時，敬請配合相關調查、檢測及健康觀察。
- 調查時將詢問疫苗接種紀錄及是否曾經罹患麻疹，因此請事先預備母子健康手冊等相關資料，以便工作人員查閱。
- 如有任何疑慮，請就近洽詢保健所。

就近洽詢保健所

